

# Dommmages somatiques et psychiques de l'usage de drogues

Conférence nationale

Alger 26-27 juin 2007

Docteur Francis Saint-Dizier

# Plan de l'exposé

- 1- Dommages selon les produits consommés
- 2- Risques selon le mode d'administration des drogues
- 3- Effets négatifs selon l'âge de début de la dépendance addictive

# Classification des drogues

rapport Roques 1998

- Analgésiques narcotiques
- Psychostimulants
- Hallucinogènes
- Dépresseurs centraux
- anxiolytiques

# Opiacés et alcool

	Dépendance physique	Dépendance psychique	neurotoxicité	Toxicité générale	Dangerosité sociale
opiacés	Très forte	Très forte	faible	Forte Sauf usage thérapeutique	Très forte
alcool	Très forte	Très forte	forte	forte	forte

# Tabac et cannabis

	Dépendance physique	Dépendance psychique	neurotoxicité	Toxicité générale	Dengerosité sociale
tabac	forte	Très forte	nulle	Très forte	cancer
cannabis	nulle	faible	faible	Faible sauf usage au long court	Trafic cancer

# psycho stimulants

	<b>d.physique</b>	d.psychique	neurotoxicité	To générale	d.sociale
cocaïne	+/-	-/+	+++	+++	+++
ecstasy	-/+	-	+/-	-/+	?
Amphé -tamine	+/-	+/-	++/-	-/+	-/?

# BZD et solvants

	D physique	D psychique	neurotox	Tox générale	Dangerosité sociale
BZD	+	+++	+/-	-/+	+ coût
solvant	-/+	-:+	++	++	-

# Complications somatiques

- Épidémiques
- Individuelles
- Liées aux produits
- Liées au mode de vie



# UDIV et épidémies virales

- Usagers: un des réservoirs de virus > population générale
- Déroulement de l'épidémie en fonction de la densité virale
- En Europe

	VIH	VHC	VHB	
Population	0/3%	3%	30%	
UDIV	10%	70%?	30%	

# UDIV autres complications

- **Infections liées aux injections:** infections bactériennes et mycosiques, abcès peau, endocardites, abcès du cerveau, pneumopathies et néphropathies
- **Liées aux impuretés:** hypertension pulmonaire
- **Liées aux produits**
  - Opiacés overdoses
  - Cocaine cardiovasculaire et neurologique
  - Haschich et solvants pulmonaire

# Effets délétères selon les âges

(usage nocif et dépendance)

- 10 à 13 ans préadolescence *solvants et tabac*
- 14 à 18 ans adolescence *alcool et cannabis*
- 19 à 25 ans jeunesse *drogues festives*
- À l'âge adulte *opiacés*

# Les ado-naissants 10-13 ans

- La précocité de l'expérimentation augmente le risque de dépendance
- Les apprentissages essentiels ne sont pas acquis
- Les risques de poly toxicomanies sont majorés

# Les adolescents 14 -18 ans

- Le haschich n'est pas le produits des bosseurs!
- Les ivresses à répétition sont désocialisantes
- Les oppositions constructives de l'adolescence ne se font pas
- Risques d'évolutions délinquantes

# Faire sa jeunesse 18 25 ans

- La fête et l'apprentissage de la maîtrise des psycho-actifs
- Le toujours plus des garçons et les conduites d'opposition/imitation des filles
- Les psychotropes et le début des grandes pathologies psychiatriques
- L'escalade de l'expérimentation

# Les ado-adultes après 25 ans

- Le risque majeur des opiacés et de l'alcoolotabagisme chronique
- Le béquillage psycho tropique face aux difficultés de l'insertion sociale
- Les drogues comme échecs de la rencontre du masculin et du féminin, l'onanisme chimique
- Plus précoce est le début plus le risque cardiovasculaire, pulmonaire et psychiatrique est grand

# Complications liées au mode de vie

- Usage de drogues et marginalisation sociale
- Mode de vie marqué par l'absence d'hygiène corporelle et psychique
- Clochardisation et désinsertion majeure quasi psychotique
- La tuberculose comme marqueur de la pauvreté



# conclusions

- Du point de vue clinique il n'y a pas de nouvelles drogues (Lewin 1924)
- Il n'y a de poison que dans la dose (Avicenne Ibn Sina)
- L'expérimentation n'a pas les mêmes risques que l'usage abusif chronique
- Les médicaments détournés de leurs indications thérapeutiques sont un grand danger à venir comme le montre le dopage sportif et le dopage sexuel